



हवामानावर आधारीत कृषि सल्ला

दिनांक : 10-03-2023

बुलढाणा(महाराष्ट्र) साठी हवामान पूर्वानुमान - वर जारी :2023-03-10 (पुढील पाच दिवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत वैध)

हवामान घटक	2023-03-11	2023-03-12	2023-03-13	2023-03-14	2023-03-15
पर्जन्यमान (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कमाल तापमान (अं.से)	33.8	34.4	35.1	35.3	35.5
किमान तापमान (अं.से)	18.1	18.5	18.9	19.4	19.3
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (टक्के)	47	46	44	48	49
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (टक्के)	37	36	34	38	39
वाऱ्याचा वेग(किमी/तास)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
वाऱ्याची दिशा(अंश)	53	83	116	90	92
मेघाच्छादन (ऑक्ट)	3	3	3	4	4

हवामान सारांश / चेतावणी:

भारतीय हवामान खात्याने आज वर्तविलेल्या पाच दिवसीय हवामान अंदाजानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात येत्या पाच दिवसात कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे.

कृषि सल्ला:

रब्बी पीकांच्या काढणीनंतर शेतजमीन खोलवर नांगरून घ्यावी जेणेकरून मातीतील किडींच्या अवस्था व मातीद्वारे होणाऱ्या रोगांचा प्रतिबंध होण्यास मदत होईल.जमिनीची खोल नांगरणी केल्यास जमिनीत पाणी खोलवर जिरते व त्यामुळे जमिनीतील ओल टिकून राहते.

संक्षिप्त संदेश सल्ला:

उन्हाळ्यात भूजल पातळी खालावते म्हणून शेतकऱ्यांनी पिकांना ओलीत करतेवेळी पाण्याचा अपव्यय होणार नाही अशा पद्धतीने पाणी द्यावे.

पिक निहाय सल्ला:

पिक	पिक निहाय सल्ला
हरभरा	परिपक झालेल्या हरभरा पिकाची कापणी (दाण्यातील ओलावा ११-१२ % असताना) करून मळणी करून घ्यावी. मळणी करून तयार झालेल्या शेतमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करण्यापूर्वी त्याला उन्हात वाळवावे.
भुईमूग	सध्याचे हवामान उन्हाळी भुईमूंग पिकावर फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव होण्यास पोषक आहे.त्याच्या नियंत्रणासाठी ५० मिली ईमिडाक्लोप्रिड २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रती एकर याप्रमाणे फवारणी करावी.
सूर्यफूल	सध्याची तापमान कक्षा लक्षात घेता उगवणपश्चात अवस्थेमध्ये सूर्यफूल पिकाला पाण्याचा ताण बसणार नाही याची काळजी घ्यावी. पिक ४५ दिवसांचे होईपर्यंत आंतरमशागत करून तणमुक्त ठेवावे.

पिक	पिक निहाय सल्ला
गहू	वेळेवर पेरणी केलेल्या गहू पिकाची परीपक्वतेनुसार काढणी शक्यतो सकाळच्या वेळेत करावी. काढणी केलेल्या पिकाची मळणी करून तयार झालेल्या शेतमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. यावेळी पक्षांद्वारे धान्याचा न्हास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

फळे आणि भाजीपाला पिक निहाय सल्ला:

फळे आणि भाजीपाला पिक	फळे आणि भाजीपाला पिक निहाय सल्ला
वांगे	सध्याच्या हवामानात वांगी पिकावरील रस शोषणाच्या किडींच्या नियंत्रणासाठी ५ % निंबोळी अर्काची किंवा फिप्रोनील २५ मिली / १० ली. पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
मिरची	हवामानाच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे मिरची पिकामध्ये रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्याकरिता उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी ईमीडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ५.० मिली/१० ली. पाणी किंवा डायमेथीओएट ३० % प्रवाही १.० मिली/ ली. पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
संत्रा	मृग बहारातील संत्रा फळाचा आकार वाढविण्यासाठी पोटॅशियम नायट्रेट १.५ किलो / १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
कांदा	कांदा पिकामध्ये मर/पानांवरील चट्टे या बुरशीजन्य रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी मॅन्कोझेब ७५ % डब्ल्यू.पी. २५ ग्रॅम + सॅन्डोव्हीट स्टीकर ५० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
टरबूज	कलिंगड या पिकांतील नागअळीच्या नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफॉस २० मिली / १० लि. पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

पशुधन विषयक निहाय सल्ला:

पशुधन विषयक	पशुधन विषयक निहाय सल्ला
बकरा किंवा बकरी	शेळ्यामधील पोटफुगी या आजाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आजारग्रस्त शेळीला ओवा, धने, जिरे व काळे मीठ टाकून साधारणतः १५ ते २० ग्रॅम या मात्रेत द्यावे.

इतर (माती / जमीन तयार करणे) निहाय सल्ला:

इतर (माती / जमीन तयार करणे)	इतर (माती / जमीन तयार करणे) निहाय सल्ला
माती चाचणी	शेतकऱ्यांनी माती परीक्षणासाठी पिकाच्या काढणीनंतर व नांगरणीच्या अगोदर मातीचा नमुना घ्यावा. माती परीक्षण अहवालानुसार शेतकऱ्यांना योग्य खत व्यवस्थापन करून चांगले उत्पादन घेता येते.